

家畜衛生だより

中央家畜保健衛生所
村山地域家畜畜産物衛生指導協会
〒990-2161 山形市漆山 736 番地
Tel 023-686-4410
Fax 023-686-5715

令和3年 12月

年末年始に向け・・・

高病原性鳥インフルエンザの 侵入防止対策再点検、徹底を！

今シーズンも高病原性鳥インフルエンザの発生が全国各地で相次いでおり、農場への侵入リスクは依然高い状況です。

引き続き、本病の侵入防止対策の徹底をお願いします。

○ これまでの発生状況一覧(R3.11～)

| 例数 | 発生場所 | 発生年月日 | 飼養羽数 | 種類 |
|----|---------|----------|-----------|---------|
| 1 | 秋田県横手市 | R3.11.10 | 約 14.3 万羽 | 採卵鶏 |
| 2 | 鹿児島県出水市 | R3.11.13 | 約 3.9 万羽 | 採卵鶏 |
| 3 | 鹿児島県出水市 | R3.11.15 | 約 9,200 羽 | 採卵鶏 |
| 4 | 兵庫県姫路市 | R3.11.17 | 約 15.5 万羽 | 採卵鶏 |
| 5 | 熊本県南関町 | R3.12.3 | 約 6.7 万羽 | 肉用鶏 |
| 6 | 千葉県市川市 | R3.12.5 | 約 340 羽 | あひる(合鴨) |
| 7 | 埼玉県美里町 | R3.12.7 | 約 1.7 万羽 | 採卵鶏 |
| 8 | 広島県福山市 | R3.12.7 | 約3万羽 | 採卵鶏 |
| 9 | 青森県三戸町 | R3.12.12 | 約 7,000 羽 | 肉用種鶏 |

～年末年始に向け～

- ★ 飼養衛生管理基準の再確認、徹底を！
- ★ 衛生管理区域、畜舎への立入り制限、消毒徹底を！
- ★ 早期発見・早期通報の徹底を！
- ★ 海外渡航の自粛を！

〜〜〜大切な鶏やあひるたちを ウイルスから守りましょう〜〜〜

1. ウイルスの侵入防止

- ① 野鳥の侵入防止 金網やネット等で侵入経路（隙間）をふさぐ
- ② 靴底に付着しての搬入を防止 踏み込み消毒槽の設置

2. 踏み込み消毒槽の設置



- 靴底が浸る程度に希釈した消毒薬をいれる。
- 底にぞうきん等を敷いてもよい。
- 消毒薬は毎日交換する（汚れると効果は著しく低減します）。

〈使用する消毒薬〉

逆性石けん（例 オスバン、パコマなど）

希釈率 200 倍程度（水 1 L にキャップ 1 杯程度）

3. 飼育舎の消毒

鶏舎内部の消毒ではほこりを吸わぬように注意、マスクが有効

- ① 糞を完全に取り除く。
- ② 希釈した消毒液を壁や施設内に十分に散布します。

* 土間や飼育舎周囲の消毒には消石灰の散布が効果的です。

（目安）1㎡当たり400g程度の消石灰を粉剤のまま散布

鳥インフルエンザウイルスには、消毒アルコール、クレゾール剤、次亜塩素酸ナトリウム（漂白剤・プールの殺菌剤）など多くの消毒薬が有効ですが、扱い易さの点で逆性石けんが優れています。

★飼っている鳥がこんな症状を示していたら、すぐに家保に連絡！

【高病原性及び低病原性鳥インフルエンザの特定症状】

- ① 同一の家きん舎内で、1日の死亡数が、遡って21日間の平均の死亡率の2倍以上の場合（※設備の故障、気温の急激な変化等の事情の場合は除く）
- ② 鶏冠・肉垂等のチアノーゼ、沈うつ、産卵率の低減等を呈する場合
- ③ 5羽以上の家きんがまとまって死亡、あるいはうずくまっている場合

中央家畜保健衛生所 023-686-4410（休日・夜間共通）