

家畜衛生だより

令和4年11月29日 No.43
庄内家畜保健衛生所
庄内地区家畜畜産物衛生指導協会
TEL 0235(68)2151
FAX 0235(66)2466

福島県伊達市で高病原性鳥インフルエンザ発生！ (国内20例目)

【発生概要】

福島県伊達市 肉用鶏 約1.7万羽飼養

- ・11月28日 死亡羽数が増加しているとの通報を受け、立入検査を実施。簡易検査で陽性を確認。
- ・11月29日 遺伝子検査の結果、疑似患畜と確定。

ウイルス侵入防止のため、飼養衛生管理の徹底、鶏の健康観察の励行、異状を認められた際の早期通報をお願いします！

今シーズンの野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルス検出状況

	検体回収場所	検体回収日	検体(種名)	亜型
52例目	宮城県 宮崎市	11/21	野鳥糞便(マガモ)	H5N1 亜型
53例目	北海道 釧路市	11/20	衰弱野鳥(タンチョウ)	H5 亜型
54, 56例目	鹿児島県 出水市	11/22, 23	死亡野鳥(ナベヅル)	H5N1 亜型
55, 57例目	鹿児島県 出水市	11/22, 23	死亡野鳥(マナヅル)	H5N1 亜型
58例目	鹿児島県 出水市	11/21	環境試料(水)	H5N1 亜型

鶏に異状が認められた際は速やかに当所まで通報を！
庄内家畜保健衛生所0235-68-2151
(夜間・休日は携帯に転送されます)

裏面へ続く→

冬季間も工夫しながら消毒を徹底し、 家畜を伝染病から守りましょう！

冬季は、消毒薬の効果の低下や、凍結のおそれがあります。以下の対策を参考に適切な消毒をしましょう！

①逆性石けん（例；パコマ、クリアキル、ロンテクト、アストップ等）は、消石灰と混ぜてアルカリ化することで効果が高まります！

◎踏込消毒槽の場合

200 倍消毒液 (10L) + 消石灰 0.2% (20 g) → 消毒液+消石灰 pH12 以上

◎動力噴霧器で使用する場合

200 倍の消毒液に食品添加物微細粒子消石灰（例；フィーネナチュラルパウダー）を同様に 0.2% (100 L なら 200 g) 添加する。

②消毒薬の凍結防止を実施しましょう！

逆性石けんと消石灰を用いる場合には、動物用消毒薬の弱アルカリ性不凍液（例：ウインターベッセルサニー「アルカリ」又は「車両用」、ビバフロスティ C など）を利用することで、消毒薬の凍結を予防することができます！

上記の不凍液がすぐに入手できない場合には、身近な方法として、消毒薬2：ウォッシャー液1の割合で混ぜることで、凍りにくくなります！

（※ウォッシャー液は引火性があるため、取扱いには十分注意してください）

