

|              |   |  |              |  |                            |                                  |
|--------------|---|--|--------------|--|----------------------------|----------------------------------|
| ふりがな<br>氏名   | 性別  |  | 1. 男<br>2. 女 | 生 年 月 日  | 1. 明治 2. 大正<br>3. 昭和 4. 平成 | 年 月 日 生<br>(満 歳)                 |
| 住 所          | 郵便番号  |  | 電 話 ( )      |  | 出 生<br>都 道 府 県             | 発病時在住<br>都 道 府 県                 |
| 初診年月日        | 1. 昭和<br>2. 平成  |  | 年 月 日        |  | 保 険 種 別                    | 1. 政 2. 組 3. 船<br>4. 共 5. 国 6. 後 |
| 身体障害者<br>手 帳 | 1. あり (等級 ____ 級) 2. なし   |  | 介 護 認 定      | 1. 要介護 (要介護度 ____ ) 2. 要支援 3. なし   |                            |                                  |
| 生 活 状 況      | 社会活動 (1. 就労 2. 就学 3. 家事労働 4. 在宅療養 5. 入院 6. 入所 7. その他 (____))<br>日常生活 (1. 正常 2. やや不自由であるが独力で可能 3. 制限があり部分介助 4. 全面介助) |  |              |  |                            |                                  |
| 家 族 歴        | 1. あり 2. なし 3. 不明   |  | 受 診 状 況      | 1. 主に入院 2. 入院と通院半々 3. 主に通院 (____/月)<br>ありの場合 (続柄 ) (最近 6 か月) 4. 往診あり 5. 入通院なし 6. その他 ( ) |                            |                                  |

発症と経過 (具体的に記述)

| 既往歴・生活歴   | 初発症状 (平成 年 月 日)  | 昏睡Ⅱ度以上出現時<br>(平成 年 月 日) の所見  |
|---|--|--|
| 肝炎患 1. あり 2. なし 3. 不明<br>B型キャリア 1. あり 2. なし 3. 不明<br>肝以外の疾患 1. あり 2. なし 3. 不明<br>輸血歴 1. あり 2. なし 3. 不明<br>薬物服用 1. あり 2. なし 3. 不明<br>飲酒 1. 大酒家 2. 常習飲酒家<br>3. 機会飲酒 4. なし | 発熱 1. あり 2. なし 3. 不明<br>食欲不振 1. あり 2. なし 3. 不明<br>全身倦怠 1. あり 2. なし 3. 不明<br>悪心・嘔吐 1. あり 2. なし 3. 不明<br>黄疸 1. あり 2. なし 3. 不明<br>腹部膨満 1. あり 2. なし 3. 不明<br>その他 1. あり 2. なし 3. 不明   | 発熱 1. あり 2. なし 3. 不明<br>黄疸 1. あり 2. なし 3. 不明<br>肝濁音界縮小 1. あり 2. なし 3. 不明<br>腹水 1. あり 2. なし 3. 不明<br>浮腫 1. あり 2. なし 3. 不明<br>頰脈 1. あり 2. なし 3. 不明<br>呼吸促拍 1. あり 2. なし 3. 不明<br>羽ばたき振戦 1. あり 2. なし 3. 不明<br>肝性口臭 1. あり 2. なし 3. 不明<br>痙攣 1. あり 2. なし 3. 不明 |
| 画像所見  | 肝組織検査  |  |
| 肝萎縮 1. あり 2. なし 3. 不明<br>(1. 超音波 2. CT 3. その他 ( ))  | 1. 生検 2. 剖検 3. なし<br>(所見: )  |  |
| 成 因   | 肝炎ウイルスマーカー   | 免疫マーカー   |
| 1. ウイルス性<br>1. A型<br>2. B型 (1. 急性感染 2. キャリア 3. 不明)<br>3. C型<br>4. E型<br>5. その他 ( )<br>2. 自己免疫性<br>3. 薬物性 ( )<br>4. 成因不明<br>5. 評価不能                                      | I g M-HA 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明<br>HBs 抗原 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明<br>I g M-HBc 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明<br>HBc (200×) 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明<br>HBV-DNA 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明<br>HCV抗体 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明<br>HCV-RNA 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明<br>HEV-RNA 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明<br>I g M-HEV 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明 | 抗核抗体 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明<br>抗平滑筋 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明<br>抗LKM1 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明<br>γグロブリン 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明<br>I g G 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明<br>I g E 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明<br>好酸球数 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明<br>D-LST 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明                                       |

|                           | 昏睡出現前    | 昏睡出現時    | 昏睡出現5日後  | 覚醒時      | 現在       |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                           | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| 昏睡度                       |          |          |          |          |          |
| AST (IU/L)                |          |          |          |          |          |
| ALT (IU/L)                |          |          |          |          |          |
| 総ビリルビン (mg/dL)            |          |          |          |          |          |
| 直接ビリルビン (mg/dL)           |          |          |          |          |          |
| 直接/総ビリルビン比                |          |          |          |          |          |
| プロトロンビン時間 (%)             |          |          |          |          |          |
| ヘパプラスチンテスト (%)            |          |          |          |          |          |
| ATIII (%)                 |          |          |          |          |          |
| アルブミン (g/dL)              |          |          |          |          |          |
| アンモニア (μg/dL)             |          |          |          |          |          |
| AFP (ng/mL)               |          |          |          |          |          |
| HGF (ng/mL)               |          |          |          |          |          |
| 血小板数 (万/mm <sup>3</sup> ) |          |          |          |          |          |
| 白血球数 (/mm <sup>3</sup> )  |          |          |          |          |          |

| 合併症    |       |       |       | 鑑別除外診断      |          |           |  |
|--------|-------|-------|-------|-------------|----------|-----------|--|
| ①感染症   | 1. あり | 2. なし | 3. 不明 | ①急性肝炎重症型    | 1. 除外できる | 2. 除外できない |  |
| ②消化管出血 | 1. あり | 2. なし | 3. 不明 | ②遅発性肝不全     | 1. 除外できる | 2. 除外できない |  |
| ③腎不全   | 1. あり | 2. なし | 3. 不明 | ③肝炎以外の急性肝不全 | 1. 除外できる | 2. 除外できない |  |
| ④DIC   | 1. あり | 2. なし | 3. 不明 | ④先行する慢性肝疾患  | 1. 除外できる | 2. 除外できない |  |
| ⑤心不全   | 1. あり | 2. なし | 3. 不明 | ⑤アルコール性肝炎   | 1. 除外できる | 2. 除外できない |  |
| ⑥脳浮腫   | 1. あり | 2. なし | 3. 不明 |             |          |           |  |

| 治療法 |             | 使用薬剤等 |       |         |       | 治療効果  |         |       |       |        |
|-----|-------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|
|     |             | 1. あり | 2. なし | 3. 今後予定 | 4. 不明 | 1. 著効 | 2. 効果あり | 3. 不変 | 4. 悪化 | 5. その他 |
|     | ステロイド       | 1. あり | 2. なし | 3. 今後予定 | 4. 不明 | 1. 著効 | 2. 効果あり | 3. 不変 | 4. 悪化 | 5. その他 |
|     | グルカゴン・インスリン | 1. あり | 2. なし | 3. 今後予定 | 4. 不明 | 1. 著効 | 2. 効果あり | 3. 不変 | 4. 悪化 | 5. その他 |
|     | 特殊組成アミノ酸    | 1. あり | 2. なし | 3. 今後予定 | 4. 不明 | 1. 著効 | 2. 効果あり | 3. 不変 | 4. 悪化 | 5. その他 |
|     | 血漿交換        | 1. あり | 2. なし | 3. 今後予定 | 4. 不明 | 1. 著効 | 2. 効果あり | 3. 不変 | 4. 悪化 | 5. その他 |
|     | 血液濾過透析      | 1. あり | 2. なし | 3. 今後予定 | 4. 不明 | 1. 著効 | 2. 効果あり | 3. 不変 | 4. 悪化 | 5. その他 |
|     | プロスタグランジン   | 1. あり | 2. なし | 3. 今後予定 | 4. 不明 | 1. 著効 | 2. 効果あり | 3. 不変 | 4. 悪化 | 5. その他 |
|     | インターフェロン    | 1. あり | 2. なし | 3. 今後予定 | 4. 不明 | 1. 著効 | 2. 効果あり | 3. 不変 | 4. 悪化 | 5. その他 |
|     | ラミブジン       | 1. あり | 2. なし | 3. 今後予定 | 4. 不明 | 1. 著効 | 2. 効果あり | 3. 不変 | 4. 悪化 | 5. その他 |
|     | サイクロスポリン    | 1. あり | 2. なし | 3. 今後予定 | 4. 不明 | 1. 著効 | 2. 効果あり | 3. 不変 | 4. 悪化 | 5. その他 |
|     | 抗凝固療法       | 1. あり | 2. なし | 3. 今後予定 | 4. 不明 | 1. 著効 | 2. 効果あり | 3. 不変 | 4. 悪化 | 5. その他 |
|     | 肝移植         | 1. あり | 2. なし | 3. 今後予定 | 4. 不明 | 1. 著効 | 2. 効果あり | 3. 不変 | 4. 悪化 | 5. その他 |
|     | その他         | 1. あり | 2. なし | 3. 今後予定 | 4. 不明 | 1. 著効 | 2. 効果あり | 3. 不変 | 4. 悪化 | 5. その他 |

医療上の問題点

医療機関名

医療機関所在地

電話番号 ( )

医師の氏名

印

記載年月日：平成 年 月 日

肝性脳症の昏睡度分類（犬山分類：1972年）

| 昏睡度 | 精神症状  | 参考事項                            |
|-----|---|---------------------------------|
| I   | 睡眠・覚醒リズムの逆転。多幸気分、ときに抑うつ状態。だらしなく、気にとめない態度。   | retrospectiveにしか判定できない場合も多い     |
| II  | 指南力（とき・場所）障害、物を取り違える（confusion）。異常行動（例：お金をまく、化粧品をゴミ箱に捨てるなど）。時に傾眠状態（普通の呼びかけで開眼し、会話ができる）。無礼な言動があったりするが、医師の指示には従う態度をみせる。 | 興奮状態がない<br>尿、便失禁がない<br>羽ばたき振戦あり |
| III | しばしば興奮状態、せん妄状態を伴い、反抗的態度をみせる。嗜眠状態（ほとんど眠っている）。外的刺激で開眼しうるが、医師の指示には従わない、又は従えない（簡単な命令には応じる）。                               | 羽ばたき振戦あり<br>指南力障害は高度            |
| IV  | 昏睡（完全な意識の消失）。痛み刺激に反応する  | 刺激に対して、払いのける動作、顔をしかめる           |
| V   | 深昏睡、痛み刺激に反応しない  |                                 |