

# 家畜衛生だより

最上家畜保健衛生所  
最上地域家畜畜産物衛生指導協会  
令和7年1月10日発行

## 高病原性鳥インフルエンザ 今シーズン21、22、23、24例目が発生！


鹿児島県及び愛知県の実験室で高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）の疑似患畜が確認されました。概要は以下のとおりです。

今シーズン事例数	発生日	発生場所	殺処分羽数（家きんの種類）
国内発生21例目	R7.1.7	鹿児島県霧島市	約12万羽（肉用鶏）
国内発生22例目	R7.1.9	愛知県常滑市	約12.9万羽（採卵鶏）
国内発生23例目	R7.1.10	愛知県常滑市	約5.7万羽（採卵鶏）
国内発生24例目	R7.1.10	愛知県常滑市	約12万羽（採卵鶏）

全国的な発生が続いております  
引き続き十分な警戒を！

全国の発生状況（R7.1.10時点）

発生都道府県	発生事例数	殺処分羽数
1道13県	24事例	約361万羽



今回の発生場所

野鳥でも引き続き感染が確認されています

全国の発生状況（R7.1.10時点）

発生都道府県	発生事例数	野鳥等の侵入防止対策の徹底をお願いします！
1道15県	94事例	

飼養鶏に異常を認めた場合は、直ちに家畜保健衛生所にご連絡ください

最上家畜保健衛生所  
（休日・夜間も対応）

電話：0233-29-1357

裏面に続く



# 飼養衛生管理基準を遵守し、農場へのウイルスの侵入を防ぎましょう

## 予防対策の重要ポイント



### ① 人・物・車両によるウイルスの持ち込み防止

- ・ 衛生管理区域、家きん舎への出入りの際の洗浄・消毒の徹底
- ・ 衛生管理区域専用の衣服、靴、家きん舎ごとの専用の靴の使用
- ・ 上記措置の記録

### ② 野生動物対策

- ・ 防鳥ネットの設置・修繕、壁の破損・隙間の修繕
- ・ 家きん舎周囲の清掃、整理・整頓
- ・ 上記措置の定期点検

今シーズンの発生事例では、一部の農場で通報の遅れが疑われています。通報が遅れた場合、農場内でウイルスが著しく増えてしまい、他の農場にウイルスが広がるリスクが高くなります。

日頃から飼養家きんをよく観察し、以下の場合は直ちに家畜保健衛生所に通報してください。

- ・ 右のような症状が複数の家きんに見られた場合
- ・ 同じ家きん舎で1日の死亡率が過去21日間の平均死亡率の2倍以上になった場合

